レジメン名 GDP (GEM1000+DEXA+CDDP75) q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 254 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
			【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 100 mL デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 440 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																	
									【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分												
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
			【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間	【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間																		
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 5 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 240 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
			【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｳﾞｨｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間	【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｳﾞｨｰﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間																	
		【滴下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント 30分で投与を終了する GEM 1000mg/㎡@GDP療法 D8のNeut減少G4又はPlt減少G3なら休薬 D8のNeutがG3又はPltがG2なら75%doseで投与							【滴下順：2】 持続点滴末梢メイン① ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 生理食塩液 100mL										
		【滴下順：5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用																				
		【滴下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 75 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント【要遮光】 CDDP 75mg/㎡@GDP 予め生食200mL抜いて調製 1.58<Cre<2.26なら75%doseで施行 Cre2.26<なら投与中止																				
		【滴下順：7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
		【滴下順：8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳﾞｨｰﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
									【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス												
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			