レジメン名 HDMTX 3000 α2w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
当日確認	当日実施確認														
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン1番目】								
		【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) 1 本 メイロン静注8. 4% 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 130 ml/h 注射フリーコメント【メイン2番目】								
		【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00	【滴下順:0] 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ダイアモックス注射用500mg 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 100 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【側管1番目】AM6:00								
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:1] 手技 中心静脈(S)② 薬品 プロキシ点滴静注用バッグ0. 75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント【別ルート1番目】MTXの直前に投与													
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:2] 手技 中心静脈(S)① 薬品 メソトレキセート注(MTX) 3000 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間3時間 注射フリーコメント MTX 3000mg/㎡、3時間で点滴※HDMTX療法 生食200mLを抜いてから調製する。 ※12:00のpHチェックで7.0以上を確認してMTXスタート ※可能なら氷を用意する MTX投与開始時刻の記録を忘れずに！ ※パクタは72時間前より休薬する													
		【滴下順:3] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL													
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg								
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-1号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ1) メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 中心静脈(S)① YDソリタT-3号輸液 500mL(ﾙﾙﾃﾑ3) メイロン静注8. 4% 20mL								
				【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg								
				【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg								
				【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg								
				【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg	【滴下順:0] 点滴中心静脈側管① ロイコボリン筋注3mg								
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg								
		【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg	【滴下順:0] 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL ダイアモックス注射用500mg								
			【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL								
		【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL	【滴下順:0] 持続中心静脈側管① 生理食塩液 50mL メイロン静注8. 4% 20mL								