レジメン名 ICE(mini) q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
当日確認	当日実施確認																					
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分																				
			【適下順:1】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分	【適下順:1】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分																		
		【適下順:2】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.7 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 IFM 1700mg/㎡ day1-3@mini-ICE	【適下順:2】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.7 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 IFM 1700mg/㎡ day1-3@mini-ICE	【適下順:2】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.7 g/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント DEHPフリーのルートを使用 IFM 1700mg/㎡ day1-3@mini-ICE																		
		【適下順:3】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間																			
		【適下順:4】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@mini-ICE	【適下順:3】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@mini-ICE	【適下順:3】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント VP-16 100mg/㎡@mini-ICE																		
		【適下順:5】 持続点滴来棒メイン① 生理食塩液 50mL	【適下順:4】 持続点滴来棒メイン① 生理食塩液 50mL	【適下順:4】 持続点滴来棒メイン① 生理食塩液 50mL																		
		【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始1時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡①@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始1時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡①@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始1時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡①@ICE(mini)																		
		【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始4時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡②@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始4時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡②@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始4時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡②@ICE(mini)																		
		【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡③@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡③@ICE(mini)	【適下順:0】 手技 持続点滴来棒メイン① 薬品 ウロミテキサン注 340 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント IFM投与開始後8時間後に別ルートにて mesna 340mg/㎡③@ICE(mini)																		
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1日分																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1cap 内服1回 朝食後 2日分																		