レジメン名 mCODOX-M用it q3w
コメント **青赤ゲキンリンパ腫**
循環適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 キロサイド注(Ara-C) 40 mg プレドニン注（水溶性）20mg 20 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 420 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1分 注射フリーコメント AraC 40mg+PSL20mg/body it@CODOX-M 全量が5mLになるように調製する ※ CNS浸潤がある場合は#1のみday5を施行する ※#2はDay1,3,15のみを施行する		【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 キロサイド注(Ara-C) 40 mg プレドニン注（水溶性）20mg 20 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 420 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1分 注射フリーコメント AraC 40mg+PSL20mg/body it@CODOX-M 全量が5mLになるように調製する ※ CNS浸潤がある場合は#1のみday5を施行する ※#2はDay1,3,15のみを施行する		【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 キロサイド注(Ara-C) 40 mg プレドニン注（水溶性）20mg 20 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 420 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1分 注射フリーコメント AraC 40mg+PSL20mg/body it@CODOX-M 全量が5mLになるように調製する ※ CNS浸潤がある場合は#1のみday5を施行する ※#2はDay1,3,15のみを施行する																				
																【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 メソトレキセート注(MTX) 15 mg プレドニン注（水溶性）20mg 10 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 150 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 全量が5mLになるように調製する ※ CNS浸潤がある場合は#1のみday17を施行する ※#2はDay1,3,15のみ施行する ※非血液毒性のG2以上が発現している場合はday17Skip ※かつMTXの濃度が0.05mg/μM以上の場合はSkip		【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 メソトレキセート注(MTX) 15 mg プレドニン注（水溶性）20mg 10 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 150 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 全量が5mLになるように調製する ※ CNS浸潤がある場合は#1のみday17を施行する ※#2はDay1,3,15のみ施行する ※非血液毒性のG2以上が発現している場合はday17Skip ※かつMTXの濃度が0.05mg/μM以上の場合はSkip				