レジメン名 mini-CHOP(DOX25＋CPA400+VCR1.0+PSL40) q3w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 オンコビン注(VCR) 1 mg 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント VCR 1.0mg/body@mini-CHOP 生食はVCRの量に合わせて0.1mg/mLで調製 投与前日よりイトリゾールを3日間休薬																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 25 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DOX 25mg/㎡ 総投与量に注意@mini-CHOP																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 400 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPA 400mg/㎡@mini-CHOP療法																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
治療	抗がん剤処方	プレドニン錠【5mg】8 錠/㎡ 内服2回　朝・昼食後 5 日分 PSL 40mg/㎡ p.o. day1-5@mini-CHOP 状況に合わせて不均等投与お願いします																				
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分																				