レジメン名 mIVAC q3w
コメント **赤ホジキンリンパ腫**
基準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
当日確認	当日実施確認																					
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																			
			【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
		【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2 day1-2@mIVAC 【1回目】12時間毎に2回投与 あらかじめ100mL抜いてから調製する	注射指示コメント【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2 day1-2@mIVAC 【1回目】12時間毎に2回投与 あらかじめ100mL抜いてから調製する																	
		【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【1回目】IFM投与前	【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【1回目】IFM投与前	【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【1回目】IFM投与前	【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【1回目】IFM投与前	【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【1回目】IFM投与前														
		【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント IFM 1500gm/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント IFM 1500gm/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント IFM 1500gm/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント IFM 1500gm/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イホマイド注(IFM) 1.5 g/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント IFM 1500gm/㎡ day1-5@mIVAC														
		【適下順:5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP-16 60mg/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP-16 60mg/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP-16 60mg/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP-16 60mg/㎡ day1-5@mIVAC	【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 エトポシド注(VP-16) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP-16 60mg/㎡ day1-5@mIVAC														
		【適下順:6】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL	【適下順:6】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL	【適下順:5】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL	【適下順:5】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL	【適下順:5】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL															
		【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【2回目】IFM投与開始から4時間後に投与	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【2回目】IFM投与開始から4時間後に投与	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【2回目】IFM投与開始から4時間後に投与	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【2回目】IFM投与開始から4時間後に投与	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【2回目】IFM投与開始から4時間後に投与														
		【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【3回目】IFM投与開始後8時間後	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【3回目】IFM投与開始後8時間後	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【3回目】IFM投与開始後8時間後	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【3回目】IFM投与開始後8時間後	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ウロミテキサン注 300 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント mesna 300mg/㎡ day1-5@mIVAC 【3回目】IFM投与開始後8時間後														
		【適下順:7】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2 day1-2@mIVAC 【2回目】12時間毎に2回投与 あらかじめ100mL抜いてから調製する	【適下順:7】 手技 中心静脈(S)① 薬品 キロサイド注(Ara-C) 2000 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント AraC 2000mg/㎡×2 day1-2@mIVAC 【2回目】12時間毎に2回投与 あらかじめ100mL抜いてから調製する																	
		【適下順:8】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL	【適下順:8】 中心静脈(S)① 生理食塩液 50mL																		
治療	抗がん剤処方	フルメトロン点眼液0．1%5mL 1 本 点眼 1日5回両目に点眼 化学療法初日から3日間 1日5回点眼@mIVAC																			