レジメン名 mIVAC q3w用IT
コメント **NHL**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
当日確認	当日実施確認																					
注射	抗がん剤注射					【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 メソトレキセート注(MTX) 15 mg プレドニン注（水溶性）20mg 10 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 300 ml/h 速度指示（時間）注入時間1分 注射フリーコメント MTX15mg/b+PSL 10mg/b it@IVAC 全量が5mLになるように調製する															
								【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 キロサイド注(Ara-C) 40 mg プレドニン注（水溶性）20mg 20 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 420 ml/h 速度指示（時間）注入時間1分 注射フリーコメント AraC 40mg+PSL 20mg/b i.t.@mIVAC 全量が5mLになるように調製する ※　CNS浸潤がある場合は#1のみday7、9を施行する ※#2はDay7,9は施行しない。		【滴下順:0】 手技 脳脊髄腔注射（腰椎） 薬品 キロサイド注(Ara-C) 40 mg プレドニン注（水溶性）20mg 20 mg 生理食塩液　20mL 5 mL 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 420 ml/h 速度指示（時間）注入時間1分 注射フリーコメント AraC 40mg+PSL 20mg/b i.t.@mIVAC 全量が5mLになるように調製する ※　CNS浸潤がある場合は#1のみday7、9を施行する ※#2はDay7,9は施行しない。										