レジメン名 Obinutuzumab（DEXあり）q1w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アセリオ静注液バッグ1000mg／100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間15分						
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ★ガザイバ点滴静注1000mg 1000 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　250mL 210 mL 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 12.5 ml/h 注射フリーコメント 予め生食250mLから生食40mL抜いて調製 フィルタ付ルートを使用 Obinutuzumab1000mg/b ＠併用Obinutuzumab ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ★【初回投与時】 12.5mL/hから投与を開始し、30分毎に12.5mLずつ上昇可 速度上昇時にinfusion reactionが無いことを確認する 最大100mL/hrまで上昇可能 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ ★【2回目以降でGr2以上のinfusion reaction無い時】 25mL/hで投与を開始し、30分毎に25mL/hずつ上昇可能 速度上昇時にinfusion reactionが無いことを確認する 最大100mL/hrまで上昇可能						
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス						