

レジメン名 Rituximab q1w  
 コメント 非ホジキンリンパ腫  
 標準適用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							休薬完了
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下順:1】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 アセリオ静注液/バッグ1000mg/100mL 500 mg            ポラミン注5mg/1mL 1 A            サクシゾン注100mg(ヒドコロチゾン/ソル・コーテフ) 1 V            用法 1日1回            速度指示(時間) 注入時間15分            注射フリーコメント アセリオから50mL抜いてから調製(500mg/b)</p>						
		<p>【滴下順:2】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 リツキシマブBS点滴静注(10mg/mL)(リツキサン) 375 mg/m<sup>2</sup>            医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管            薬品 生理食塩液 500mL 1 袋            用法 1日1回            速度指示(速度) 時間当たり 50 ml/h            注射フリーコメント Rituximab 375mg/m<sup>2</sup> @併用Rituximab            * * * * 初回投与時 * * * * *            最初の30分は50mL/hで投与開始。            30分毎に50mL/hずつ上げて投与可能。            問題なければ400mL/hまで上昇可能。            * * * 2回目以降(初回の副作用が軽微の場合) * * *            最初の30分は100mL/hで投与開始可能。            30分毎に100mL/hずつ上げて投与可能。            問題なければ400mL/hまで上昇可能。</p>						
		<p>【滴下順:3】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶            用法 1日1回            速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h            速度指示(時間) 注入時間5分            注射フリーコメント リンス</p>						