レジメン名 V-CAP q3w
コメント **マントル細胞リンパ腫**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 50 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント DOX 50mg/㎡ 総投与量に注意 @V-CAP																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 750 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPA 750mg/㎡@V-CAP																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@V-CAP			【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@V-CAP				【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@V-CAP			【滴下順:0】 手技 皮下注射 薬品 ベルケイド注 1.3 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬 薬品 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント Bor 1.3mg/㎡@V-CAP									
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
		プレドニン錠【5mg】20 錠 10 -6 -4 -0 -0 -0 で投与 内服3回 朝・昼・夕食後 5 日分 PSL 100mg/body p.o. day1-5																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			