レジメン名 VCP(CPA750+VCR1.4+PSL100) q2w
コメント **非ホジキンリンパ腫**
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 オンコビン注(VCR) 1.4 mg/㎡ 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 注射フリーコメント VCR 1.4mg/㎡ 上限2mg/b@VCP 生食はVCRの量に合わせて0.1mg/mLで調製 投与前日よりイトリゾールを3日間休薬													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 750 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPA 750mg/㎡@VCP療法													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
治療	抗がん剤処方	プレドニン錠【5mg】20 錠 10 -6 -4 -0 -0 -0 で投与 内服3回 朝・昼・夕食後 5 日分 PSL 100mg/body p.o. day1-5@VCP													