レジメン名 Bev 10 q2w
コメント 悪性神経膠腫
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用 併用の場合はskip可能													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 10 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント Bev 10mg/kg@併用Bev 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス　併用レジメンにリンスある場合はskip可能													