レジメン名 ABCP q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A ボララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 296 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 テセントリク点滴静注1200mg(60mg/mL) 1200 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 270 ml/h 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント Atezolizumab 1200mg/body@ABCP q3w 全量270mL フィルタ付ルートを使用 ※忍容性良好なら2回目以降30分まで短縮可能																				
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分																				
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可 Bev 15mg/kg@Atezolizumab＋Bev15+CBDCA5＋PTX200 q3w																				
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 200 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　500mL 500 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間3時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 200mg/㎡@Atezo＋Bev15+CBDCA5＋PTX200 q3w																				
		【適下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 50 ml 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント カルボ前フラッシュ																				
		【適下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注　5%　250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC@Atezolizumab＋Bev15+CBDCA5＋PTX200 q3w																				
		【適下順:8】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 50 ml 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般）アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			