レジメン名 Atezolizumab+CBDCA5＋nab-PTX100 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液ﾊｯﾞ1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分 注射フリーコメント ★★Atezolizumabはフィルタ使用で投与★★ ★★nabPTXはフィルタ禁止！側管で投与★★																				
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 テセントリク点滴静注(60mg/mL) 1200 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間1時間 注射フリーコメント Atezolizumab1200mg@Atezolizumab+CBDCA＋nabPTX q3w 全量270mL ※忍容性良好なら2回目以降30分まで短縮可能 ★★Atezolizumabフィルタ付ルートを使用★★ ★★nabPTXはフィルタ禁止！側管で投与★★																				
		【滴下順：0】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント Atezolizumab後のリンス																				
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント アプラキサン前フラッシュ																				
									【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分 注射フリーコメント ★★nabPTXフィルタ禁止！フィルタ無ルートで投与★★							【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 408 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分 注射フリーコメント ★★nabPTXフィルタ禁止！フィルタ無ルートで投与★★						
		【滴下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント 空の生食100mLバッグに薬液を注入 薬液量：nab-PTX 5mg/mL nabPTX100mg/㎡@Atezolizumab+CBDCA5＋nabPTX100 q3w ★★nabPTXフィルタ禁止！ day1は側管で投与★★ ★★Atezolizumabはフィルタ付ルートで投与★★ day8,15はフィルタ無ルートを使用							【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント 空の生食100mLバッグに薬液を注入 薬液量：nab-PTX 5mg/mL nabPTX100mg/㎡@Atezolizumab+CBDCA5＋nabPTX100 q3w ★★nabPTXフィルタ禁止！ day1は側管で投与★★ ★★Atezolizumabはフィルタ付ルートで投与★★ day8,15はフィルタ無ルートを使用							【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アブラキサン注(nab-PTX) 100 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント 空の生食100mLバッグに薬液を注入 薬液量：nab-PTX 5mg/mL nabPTX100mg/㎡@Atezolizumab+CBDCA5＋nabPTX100 q3w ★★nabPTXフィルタ禁止！ day1は側管で投与★★ ★★Atezolizumabはフィルタ付ルートで投与★★ day8,15はフィルタ無ルートを使用						
		【滴下順：5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント アプラキサン後 フラッシュ																				
		【滴下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC：5 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC@Atezolizumab+CBDCA5＋nab-PTX100 q3w																				
		【滴下順：7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス								【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス						
		般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前																				
			般）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			