レジメン名 CBDCA 5＋PEM 500＋Bev 15 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アリムタ注(PEM) 500 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間10分 注射フリーコメント パンビタン及びB12要確認 PEM 500mg/㎡@CBDCA+PEM+Bev																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注　5%　250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5 AUC@CBDCA+PEM+Bev																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液　100mL 100 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可 Bev 15mg/kg@CBDCA＋PEM+Bev																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 50 ml 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方	パンビタン末（調剤用）1 g 内服1回　朝食後 21 日分 CBDCA＋PEM+Bev療法																				
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分																			
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分																			