レジメン名 CBDCA 5＋S1 80 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ﾌﾄﾞｳ糖注 5% 250mL 250 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5 AUC@CBDCA+S1																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 50 ml 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方	ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 S1 80mg/㎡ day1-14 @CBDCA+S1療法 1.25㎡未満 40mg/回→4錠/day 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→0錠/day(25mg錠で) 1.5㎡以上 60mg/回→6錠/day																				
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 S1 80mg/㎡ day1-14 @CBDCA+S1療法 1.25㎡未満 40mg/回→0錠/day(20mg錠で) 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→4錠/day 1.5㎡以上 60mg/回→0錠/day(20mg錠で)																				
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分																			