レジメン名 CDDP 60＋S1 80 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
																						休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳｨﾝｸﾞF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液(1mEq/mL)20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 254 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																				
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																	
			【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｳｨﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間3時間	【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｳｨﾝD) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 速度指示(時間) 注入時間3時間																	
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																			
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用																			
		【適下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 60 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製 CDDP 60mg/㎡@CDDP+S1 【要避光】																			
		【適下順:6】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳｨﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																			
		【適下順:7】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｳｨﾝF) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間																			
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																			
		ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 S1 80mg/㎡ day1-14 @CDDP+S1療法 1.25㎡未満 40mg/回→4錠/day 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→6錠/day(25mgで) 1.5㎡以上 60mg/回→8錠/day																			
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 S1 80mg/㎡ day1-14 @CDDP+S1療法 1.25㎡未満 40mg/回→0錠(20mgで) 1.25㎡～1.5㎡ 50mg/回→4錠/day 1.5㎡以上 60mg/回→6錠(20mgで)																			
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																		
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分																		