レジメン名 CDDP 80＋VNR 25 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 ▼硫酸Mg補正液（1mEq/mL）20mL 8 ml 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 254 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液 500mL(ソルデム3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																		
			【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ヴィーンD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ヴィーンD) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間） 注入時間3時間																		
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(デカドロン) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(デカドロン) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
									【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 200 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分												
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ロゼウス注(10mg/mL)(ナベルビン/VNR) 25 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント VNR 25mg/㎡ day1,8@CDDP+VNR								【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ロゼウス注(10mg/mL)(ナベルビン/VNR) 25 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント VNR 25mg/㎡ day1,8@CDDP+VNR												
		【滴下順:5】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 500mL 1 袋 サクシゾン注300mg(ヒドロコルチゾン/ソル・コーテフ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント VNRの血管炎予防目的								【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 500mL 1 袋 サクシゾン注300mg(ヒドロコルチゾン/ソル・コーテフ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント VNRの血管炎予防目的												
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント フィルタ付のルートを使用																				
		【滴下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 80 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製 CDDP 80mg/㎡@CDDP+VNR療法 【要遮光】																				
		【滴下順:8】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
		【滴下順:9】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ヴィーンF) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h 速度指示（時間） 注入時間2時間																				
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分 CDDP＋VNR療法																				
			般）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			