レジメン名 DOC60＋RAM10 q3w@入院
コメント **非小細胞肺癌**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 サイラムザ点滴静注液(10mg/mL) 10 mg/kg 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント RAM 10mg/kg @DOC＋RAM フィルタ付ルートで投与																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント サイラムザ後リンス																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドセタキセル注(DOC･ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ) 60 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント DOC 60mg/㎡ @DOC＋RAM 状況に応じて1時間まで短縮可																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				