**レジメン名** Durvalumab q2w
**コメント** 非小細胞肺癌
**標準適用日数** 14日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 イミフィンジ点滴静注用 10 mg/kg<br>医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管<br>薬品 生理食塩液　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示(時間) 注入時間1時間<br>注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用<br>Durvalumab10mg/kg<br>BW150kgを超えた場合は1～15mg/mlになるように調整 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h<br>速度指示(時間) 注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス | | | | | | | | | | | | | |