レジメン名 erlotinib 150+Bev15 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 15 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能 Bev 15mg/kg@Erlotinib+Bev																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																				
治療	抗がん剤処方	タルセバ錠150mg 1 錠 内服1回　食間 空腹時 21 日分 ※朝食後2時間後～昼食1時間前までに内服 Erlotinib+Bev療法																				