レジメン名 VNR 25 q3w
コメント 非小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ロゼウス注(10mg/mL)(ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ/VNR) 25 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント VNR 25mg/㎡ day1,8 @VNR							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ロゼウス注(10mg/mL)(ﾅﾍﾞﾙﾋﾞﾝ/VNR) 25 mg/㎡ 医療従事者向けコメント ▲毒薬△冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント VNR 25mg/㎡ day1,8 @VNR													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 サクシゾン注300mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VNRの血管炎予防目的							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　500mL 1 袋 サクシゾン注300mg(ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁｿﾞﾝ／ｿﾙ･ｺｰﾃﾌ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VNRの血管炎予防目的													