レジメン名 CBDCA5+PTX80（ddTC）q4w
コメント 乳がん
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント 開通確認用													
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 292 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 初回のDEXAは16mg/bで投与							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 292 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 初回のDEXAは16mg/bで投与							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A ファモチジン注20mg／NS20mL (ｶﾞｽﾀｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 292 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分 注射フリーコメント 初回のDEXAは16mg/bで投与													
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント パクリ前フラッシュ							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント パクリ前フラッシュ							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント パクリ前フラッシュ													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 80 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/㎡@ddTC							【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 80 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/㎡@ddTC							【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 80 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/㎡@ddTC													
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分							【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分							【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分													
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント CBDCA 5 AUC@ddTC																											
		【滴下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 YDソリタT-3号輸液　500mL(ｿﾙﾃﾞﾑ3) 1 本 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h 速度指示（時間）注入時間3時間																											
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分																											
			般）アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																										