レジメン名 ddAC（DXR 60+CPA 600）q2w
コメント 乳がん
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
		【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分													
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドキソルビシン注(DXR・ADR) 60 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間15分 注射フリーコメント DXR 60mg/㎡ @ddAC療法													
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 600 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間30分 注射フリーコメント CPA 600mg/㎡ @ddAC療法													
		【滴下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与													
		般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分													
			般）アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法の翌日から2日間内服												
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 内服2回　朝・昼食後 3 日分 化学療法の翌日から3日間内服												
			般）テプレノンカプセル50mg 3 cap 内服3回　朝・昼・夕食後 3 日分 化学療法の翌日から3日間内服												