レジメン名 DOC75＋Pertuzumab840+Tmab8（初回）q3w
コメント **乳癌**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ライン確保用																				
		【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パージェタ点滴静注　420mg/14mL 840 mg 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント 初回、6週開いた時 PER 840mg/body 初回60分、次回以降30分で投与																				
		【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント PerとHERの間のリンス																				
		【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ) 8 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント 3wTmab 8mg/kg 初回、29日以上開いた場合 初回90分、2回目以降以降30分で投与可能 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【適下順：5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 624 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント HERとDOCの間のリンス																				
		【適下順：6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドセタキセル注（DOC･ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ）75 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント DOC：75mg/㎡ @DOC+Tmab+PER（初回）																				
		【適下順：7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント DOC終了後のリンス																				