レジメン名 DOC75＋Pertuzumab420+Tmab6（2回目以降）q3w
コメント **乳癌**
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント ライン確保用																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 パージェタ点滴静注　420mg/14mL 420 mg 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント PER 420mg/body（2回目以降） 初回60分、2回目以降30分で投与可能																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント PerとHERの間のリンス																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ) 6 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水　20mL 1 本 生理食塩液　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間30分 注射フリーコメント 3wTmab 6mg/kg（2回目以降） 初回90分、2回目以降30分で投与可能 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 624 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント HERとDOCの間のリンス																				
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ドセタキセル注(DOC･ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ) 75 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント DOC：75mg/㎡ @DOC+Tmab+PER（2回目以降）																				
		【滴下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント DOC終了後のリンス																				