レジメン名 EC (Epi 90+CPA 600) q3w
コメント 乳がん
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント 点滴前にアプレピタント内服																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エピルビシン注(ﾌｧﾙﾓﾙﾋﾞｼﾝ/EPI) 90 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント Epi 90mg/㎡ @EC (Epi 90+CPA600) q3w																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 600 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント CPA 600mg/㎡ @EC (Epi 90+CPA600) q3w																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 化学療法の翌日から2日間内服 内服1回 朝食後 2 日分																			
			デカドロン錠0．5mg 16 錠 化学療法の翌日から3日間内服 内服2回 朝・昼食後 3 日分																			
			般)テプレノンカプセル50mg 3 cap 化学療法の翌日から3日間内服 内服3回 朝・昼・夕食後 3 日分																			