レジメン名 FEC100 iv q3w コメント 乳癌 標準適用日数 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 」10病 F | ∃ 11病E | 12病日 | 13病日 | 14病 E | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 21病日 |
|------|--------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ 0.75 mg 1 袋 デキサート注射液6.6 mg/2 mL(デカドロン) 1 V デキサート注射液1.65 mg/0.5 mL(デカドロン) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント ※点滴前にイメンド内服 【滴下順:2】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 日前 「MR - 21 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エピルビシン注(ファルモルビシン/EPI) 100 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間15分 注射フリーコメント FEC100療法:EPI 100mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 エンドキサン注(CPA) 500 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント FEC100療法: CPA 500mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 500 mg/m ² 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント 全開で投与。 FEC100療法:5FU 500mg/m ² | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般) アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1~1.5時間前 1 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般) アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 化学療法の翌日から2日間内服 内服1回 朝食後 2 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | デカドロン錠0.5mg 16 錠 化学療法の翌日から3日間内服 内服2回 朝・昼食後3日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般)テプレノンカプセル50mg 3 cap 化学療法の翌日から3日間内服 内服3回 朝・昼・夕食後 3 日分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |