

レジメン名 wPTX 80+wTmab 4初回 q1w  
 コメント 乳癌  
 標準適用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了 当日確認	休薬完了 当日実施確認							休薬完了
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下順:1】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 グラニセトロン点滴静注/バック1mg/50mL 1袋            デキサート注射液6.6mg/2mL(デカドロン) 1V            ポラミン注5mg/1mL 1A            ファモチジン注20mg/NS20mL(ガスター) 1本            用法 1日1回            速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h            速度指示(時間) 注入時間15分</p>						
		<p>【滴下順:2】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 パクリタキセル点滴静注(PTX) 80 mg/m<sup>2</sup>            ブドウ糖注 5% 250mL 1袋            用法 1日1回            速度指示(時間) 注入時間1時間            注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用            PTX 80mg/m<sup>2</sup>@wPTX+Tmab</p>						
		<p>【滴下順:3】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ハーセプチン) 4 mg/kg            医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管            薬品 注射用水 20mL 1本            生理食塩液 250mL 1袋            用法 1日1回            速度指示(時間) 注入時間1時間30分            注射フリーコメント Tmab 4mg/kg@wPTX+Tmab  <b>【初回または15日以上間隔開いた場合】</b>            初回90分、2回目以降30分で投与可能            150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解(21mg/mL)</p>						
		<p>【滴下順:4】            手技 持続点滴末梢メイン①            薬品 生理食塩液 50mL 1瓶            用法 1日1回            速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h            速度指示(時間) 注入時間5分            注射フリーコメント リンス。全開で投与。</p>						