

レジメン名 wPTX 80+wTmab 2 回目以降 q1w
 コメント 乳癌
 標準適用日数 7日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日
休薬完了	休薬完了							休薬完了
当日確認	当日実施確認							
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(テカトロン) 1 V ポララミン注5mg/1mL 1 A ファモチジン注20mg/NS20mL (ガスター) 1 本 用法 1日1回 速度指示 (速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示 (時間) 注入時間15分</p>						
		<p>【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点滴静注(PTX) 80 mg/m² ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示 (時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 80mg/m²@wPTX+Tmab</p>						
		<p>【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツスマブBS点滴静注用(ハーセプチン) 2 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示 (時間) 注入時間30分 注射フリーコメント Tmab 2mg/kg@wPTX+Tmab 2回目以降投与時間30分まで短縮可能 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解(21mg/mL)</p>						
		<p>【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示 (速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示 (時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス。全開で投与。</p>						