

レジメン名 wPTX 90+Bev 10 q4w
 コメント 乳癌
 標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了 当日確認	休薬完了 当日実施確認																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下順-1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセロン点滴静注液バック1mg/50mL 1袋 デキザート注射液6.6mg/2mL(フカD) 1V ポララミン注5mg/1mL 1A ファモチジン注20mg/NS20mL (ガスター) 1本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分</p>							<p>【滴下順-1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセロン点滴静注液バック1mg/50mL 1袋 デキザート注射液6.6mg/2mL(フカD) 1V ポララミン注5mg/1mL 1A ファモチジン注20mg/NS20mL (ガスター) 1本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分</p>							<p>【滴下順-1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセロン点滴静注液バック1mg/50mL 1袋 デキザート注射液6.6mg/2mL(フカD) 1V ポララミン注5mg/1mL 1A ファモチジン注20mg/NS20mL (ガスター) 1本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 292 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分</p>													
		<p>【滴下順-2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点滴静注(PTX) 90 mg/m² ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 90mg/m² @PTX+Bev</p>							<p>【滴下順-2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点滴静注(PTX) 90 mg/m² ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 90mg/m² @PTX+Bev</p>							<p>【滴下順-2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 バクリタキセル点滴静注(PTX) 90 mg/m² ブドウ糖注 5% 250mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付 DEHPフリーのルートを使用 PTX 90mg/m² @PTX+Bev</p>													
		<p>【滴下順-3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>							<p>【滴下順-3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>							<p>【滴下順-3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>													
		<p>【滴下順-4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 10 mg/kg 生食食塩液 100mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 10mg/kg@PTX+Bev</p>							<p>【滴下順-4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 10 mg/kg 生食食塩液 100mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 10mg/kg@PTX+Bev</p>							<p>【滴下順-4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 10 mg/kg 生食食塩液 100mL 1袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、以降30分で投与可能 Bev 10mg/kg@PTX+Bev</p>													
		<p>【滴下順-5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>							<p>【滴下順-5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>							<p>【滴下順-5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生食食塩液 50mL 1瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与</p>													