レジメン名 AMR40 q3w
コメント 小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
			【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																		
		【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 カルセド注(AMR) 40 mg/㎡ 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント AMR 40mg/㎡ day1-3@AMR 全量約20mLになるように調製する。 調製の都合で全量20mLでない場合がある。 調製後3時間以内に投与を完了する。	【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 カルセド注(AMR) 40 mg/㎡ 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント AMR 40mg/㎡ day1-3@AMR 全量約20mLになるように調製する。 調製の都合で全量20mLでない場合がある。 調製後3時間以内に投与を完了する。	【滴下順:2】 手技 ワンショット静脈注射 薬品 カルセド注(AMR) 40 mg/㎡ 生理食塩液 20mL 1 本 用法 1日1回 注射フリーコメント AMR 40mg/㎡ day1-3@AMR 全量約20mLになるように調製する。 調製の都合で全量20mLでない場合がある。 調製後3時間以内に投与を完了する。																		
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																		