レジメン名 CBDCA 5+CPT 60 q4w
コメント 小細胞肺癌
標準適用日数 28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分												
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPT 60mg/㎡ day1,8,15@CBDCA+CPT							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPT 60mg/㎡ day1,8,15@CBDCA+CPT							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 60 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント CPT 60mg/㎡ day1,8,15@CBDCA+CPT												
		【滴下順:3】 手技 点滴末梢メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC day1@CBDCA+CPT																											
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス												
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																											
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																										
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																										
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																										