レジメン名 CBDCA 5+VP16 100+Atezolizumab q3w
コメント 小細胞肺癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
		【滴下順:2】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 テセントリク点滴静注1200mg(60mg/mL) 1200 mg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 270 ml/h 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント フィルタ付ルートを使用 全量270mL 初回60分、2回目以降30分まで短縮可 Atezolizumab 1200mg/b@CBDCA+VP16+Atezolizumab																				
		【滴下順:3】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント Atezo用リンス																				
		【滴下順:4】 手技 点滴来棹メイン① 薬品 カルボプラチン(CBDCA)点滴静注(10mg/mL) AUC:5 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CBDCA 5AUC day1@CBDCA+VP16+Atezolizumab																				
			【滴下順:1】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																	
		【滴下順:5】 手技 点滴来棹メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎥ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎥ day1-3@CBDCA+VP16+Atezolizumab DEHPフリーのルートを使用 100mg/bを超えたら5%TZ500mLを用いて希釈する	【滴下順:2】 手技 点滴来棹メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎥ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎥ day1-3@CBDCA+VP16+Atezolizumab DEHPフリーのルートを使用 100mg/bを超えたら5%TZ500mLを用いて希釈する	【滴下順:2】 手技 点滴来棹メイン① 薬品 エトポシド注(VP-16) 100 mg/㎥ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント VP16 100mg/㎥ day1-3@CBDCA+VP16+Atezolizumab DEHPフリーのルートを使用 100mg/bを超えたら5%TZ500mLを用いて希釈する																	
		【滴下順:6】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス	【滴下順:3】 手技 持続点滴来棹メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス																	
		般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																			