レジメン名 Aflibercept+FOLFIRI150 q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用													
		【適下順：1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間15分													
		【適下順：2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 ザルトラップ静注用 4 mg/kg 生理食塩液　100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間 注射フリーコメント Aflibercept4mg/kg@Aflibercept+FOLFIRI150 フィルタ付ルートを使用 0.6～8mg/mlの濃度で調製													
		【適下順：3】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 200 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間2時間 注射フリーコメント【イリノテカンと同時に投与】 l-LV 200mg/㎡@Aflibercept+FOLFIRI150													
		【適下順：3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 150 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント【レボホリナートと同時に投与】 CPT-11　150mg/㎡@Aflibercept+FOLFIRI150													
		【適下順：4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡ 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリが終了次第全開で投与】 5-FU 400mg/㎡@Aflibercept+FOLFIRI150													
		【適下順：5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡@Aflibercept+FOLFIRI150													
治療	抗がん剤処方	般）アプレピタントカプセル 125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分													
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回　朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始 Aflibercept+FOLFIRI150													
			般）アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服												
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服 Aflibercept+FOLFIRI150												