レジメン名 CapeOX+Tmab8（胃癌・初回）q3w
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 212 ml/h 速度指示（時間） 注入時間15分																				
		【滴下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 トラスツズマブBS点滴静注用(ﾊｰｾﾌﾟﾁﾝ) 8 mg/kg 医療従事者向けコメント △冷蔵庫保管 薬品 注射用水 20mL 1 本 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間1時間30分 注射フリーコメント【初回または29日以上間隔開いた場合】 Tmab 8mg/kg（初回）@CapeOX+Tmab 初回は90分かけて投与 150mgは注射用水7.2mLで、60mgは3mLで溶解（21mg/mL）																				
		【滴下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 130 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間） 注入時間2時間 注射フリーコメント L-OHP 130mg/㎡@CapeOX+Tmab																				
		【滴下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度） 時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間） 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与																				
治療	抗がん剤処方	般）カペシタビン錠300mg 2000mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 C法、2000mg/㎡、tri-weekly CapeOX+Tmab療法 Cape体表面積と投与量 1.36㎡未満 1回1200mg、4錠 1.36㎡以上1.66㎡未満、1回1500mg、5錠 1.66㎡以上1.96㎡未満 1回1800mg、6錠 1.96㎡以上 1回2100mg、7錠																				
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始																				
		般）アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																				
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分																			
			般）アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分																			