レジメン名 CPT150＋Cet250（2回目以降）q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
									【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ボララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 612 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分						
		【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/㎡ 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Cet 250mg/㎡(2回目以降)@CPT+Cet							【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/㎡ 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Cet 250mg/㎡(2回目以降)@CPT+Cet						
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 150 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント CPT-11 150mg/㎡@CPT+Cet													
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス							【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス						
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分													
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始													
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目、3日目に内服												
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目、3日目に内服												