レジメン名 DOC 40 +S1q3w #2～＃7（内服有）
コメント 胃癌
標準適用日数 21日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順：1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順：2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ドセタキセル注（DOC・ｱﾙｺｰﾙﾌﾘｰ）40 mg/㎡<br>医療従事者向けコメント ▲毒薬<br>薬品 ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間1時間30分<br>注射フリーコメント DOC 40mg/㎡ @DOC+S1<br>状況に応じて1時間まで短縮可 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順：3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント リンス 全開で投与 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡<br>内服2回 朝・夕食後 14 日分<br>DOC+S1療法 S1 80mg/㎡<br>2週間内服し1週間休薬<br>S1 体表面積初回基準量<br>1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠<br>1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠<br>1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡<br>内服2回 朝・夕食後 14 日分<br>DOC+S1療法 S1 80mg/㎡<br>2週間内服し1週間休薬<br>S1 体表面積初回基準量<br>1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠<br>1.25㎡以上1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠<br>1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |