レジメン名 FL(infusional 5FU+l-LV)q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用													
		【滴下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【滴下順:2】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 200 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 200mg/㎡@FL													
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡ 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント レボホリ投与後全開で投与 5-FU 400mg/㎡													
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡@FL													