

レジメン名 FL(infusional 5FU+LV)+Cet400初回 q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休業完了	休業完了														休業完了
注射	抗がん剤注射	【滴下薬:1】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用							【滴下薬:1】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用						
		【滴下薬:1】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液0.6mg/2mL(7.5μg/mL) 1 V ボラミン注5mg/1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 412 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【滴下薬:2】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 アービタックス注(Cet) 400 mg/ml 生理食塩液 500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食100mLを抜いて調製 Cet 400mg/ml(初回)≡FL+Cet													
		【滴下薬:3】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注 (I-LV) 200 mg/ml ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント I-LV 200mg/ml													
		【滴下薬:4】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/ml 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント レボホリ投与後全開で投与 5-FU 400mg/ml													
		【滴下薬:5】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/ml 生理食塩液 100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/ml≡FL+Cet													
									【滴下薬:1】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ボラミン注5mg/1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 612 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分						
									【滴下薬:2】 手技 中心静脈(S×1) 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/ml 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント Cet 250mg/ml(2回目以降)≡FL+Cet						
									【滴下薬:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与						