

レジメン名 FL(Infusional 5FU+LV)+Cet250 2回目を以降 q2w
 コメント 大腸癌
 標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	
休業完了	休業完了														休業完了	
注射	抗がん剤注射	【滴下順:0】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射アリアコメント 間違確認用							【滴下順:0】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射アリアコメント 間違確認用							
		【滴下順:1】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサト注射液6.6mg/2mL(子ガ®) 1 V ポララミン注5mg/1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 412 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分														
										【滴下順:1】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 ポララミン注5mg/1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 612 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分						
		【滴下順:2】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/ml 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射アリアコメント Cet 250mg/ml(2回目を以降)#FL+Cet								【滴下順:2】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 アービタックス注(Cet) 250 mg/ml 生理食塩液 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射アリアコメント Cet 250mg/ml(2回目を以降)#FL+Cet						
		【滴下順:3】 手技 中心静脈(留置管精密持続①) 薬品 レボホリナート注(L-LV) 200 mg/ml ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射アリアコメント L-LV 200mg/ml														
		【滴下順:4】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/ml 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射アリアコメント レボホリ投与後全開で投与 5-FU 400mg/ml														
		【滴下順:5】 手技 中心静脈(S/I) 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/ml 生理食塩液 100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射アリアコメント 5-FU 2400mg/ml#FL+Cet														
											【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射アリアコメント リンス 全開で投与					