**レジメン名** FOLFIRI＋Bev5 q2w
**コメント** 大腸癌
**標準適用日数** 14日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【適下順：0】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 生理食塩液　20mL 1 A<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間2分<br>注射フリーコメント 開通確認用 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：1】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：2】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 アバスチン注(Bev) 5 mg/kg<br>生理食塩液　100mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間1時間30分<br>注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能<br>Bev 5mg/kg@FOLFIRI+Bev | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：3】<br>手技 中心静脈側管精密持続①<br>薬品 レボホリナート注(l-LV) 200 mg/㎡<br>ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間2時間<br>注射フリーコメント【イリノテカン】と同時に投与<br>l-LV 200mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：3】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 150 mg/㎡<br>ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間1時間30分<br>注射フリーコメント【レボホリナートと同時に投与。】<br>CPT-11 150mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：4】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡<br>生理食塩液　50mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間5分<br>注射フリーコメント レボホリ終了次第全開で投与<br>5-FU 400mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【適下順：5】<br>手技 中心静脈(S)①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡<br>生理食塩液　100mL 52 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間46時間<br>注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算<br>注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡ | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap<br>内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分 | | | | | | | | | | | | | |
| | | ナウゼリンOD錠10mg 3 錠<br>内服3回　朝・昼・夕食前 7 日分<br>化学療法初日夕方から内服開始 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap<br>内服1回　朝食後 2 日分<br>化学療法2日目と3日目に内服 | | | | | | | | | | | | |
| | | | デカドロン錠0．5mg 8 錠<br>内服2回　朝・昼食後 2 日分<br>化学療法2日目と3日目に内服 | | | | | | | | | | | | |