レジメン名 FOLFIRI＋Cet500 Biweekly q2w
コメント 大腸癌
標準適用日数 14日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
休薬完了	休薬完了														休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:0】 手技 中心静脈(S)① 薬品 生理食塩液　20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用													
		【適下順:1】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V ポララミン注5mg／1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【適下順:2】 手技 中心静脈(S)① 薬品 アービタックス注(Cet) 500 mg/㎡ 生理食塩液　500mL 400 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント ※投与時間2回目90分、3回目以降60分まで短縮可 生食100mLを抜いてから調製 Cet 500mg/㎡@FOLFIRI+Cet500 Biweekly													
		【適下順:3】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注(I-LV) 200 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント【イリノテカン】と同時に投与 I-LV 200mg/㎡ @FOLFIRI+Cet500 Biweekly													
		【適下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 150 mg/㎡ ブドウ糖注　5%　250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント レボホリナートと同時に投与 CPT-11 150mg/㎡ @FOLFIRI+Cet　Biweekly													
		【適下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 400 mg/㎡ 生理食塩液　50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント レボホリ終了次第全開で投与 5-FU 400mg/㎡@FOLFIRI＋Cet500 Biweekly													
		【適下順:5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 2400 mg/㎡ 生理食塩液　100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液総量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/㎡@FOLFIRI＋Cet500 Biweekly													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回　化学療法1～1.5時間前 1 日分													
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回　朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始													
			般)アプレピタントカプセル　80mg 1 cap 内服1回　朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服												
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回　朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服												