付	1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日
· 秦完了	了 【滴下順:0】 手技 中心静脈(S)(1) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度 指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用													休薬完了
	[滴下順:1] 手技中心静脈(S)① 薬品 アロキシ点滴静注用パッグ0.75mg 1 袋 デキサー注射液6.6mg/2mL(デかロ)1 V デキサー注射液6.6mg/25mL(デかロ)2 A ポララミン注5mg/1mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度)時間当たり216 ml/h 速度指示(時間)注入時間15分													
	【滴下順:2】 手技 中心静脈(S/① 薬品 アパスチン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度 指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能 Bev 5mg/kg [®] FOLFOXIRI+Bev													
射 抗がん剤	【滴下順:3】 手技 中心静脈(S)① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 165 mg/m ブドウ糖注 59~ 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間 注射フリーコメント CPT 165mg/m [®] FOLFOXIRI+Bev													
	【滴下順:4】 手技 中心静脈(S)① 薬品 オキサリブラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 85 mg/m ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間と時間 注射プリーコメントレボホリナートと同時に投与 L-OHP 85mg/m'@FOLFOXIRI+Bev													
	【滴下順:4】 手技 中心静脈側管精密持続① 薬品 レボホリナート注(I-LV) 200 mg/m ブドウ糖注 5% 250mL I 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射プリーコメント オキサリブラチンと同時に投与 I-LV 200mg/m [®] FOLFOXIRI+Bev													
	【滴下順:5】 手技 中心静脈(S)① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 3200 mg/㎡ 生理食塩液 250mL 166 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 4.791 ml/h 速度指示(時間) 注入時間48時間 注射コメント 輸液総量を230mLで自動計算 注射コメント 5FU 3200mg/㎡@FOLFOXIRI+Bev													
	般) アプレピタントカブセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1~1.5時間前1日分													
	ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始													
療 抗がん剤	制処方	般) アブレビタントカブセル 80mg 1 cap 内服 1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服												
		デカドロン錠O. 5mg 16 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服												