レジメン名 5FU600+LV250　q8w
コメント **大腸癌**
標準適用日数 56日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)						
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV						
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡						
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分						

日付		29病日	30病日	31病日	32病日	33病日	34病日	35病日	36病日	37病日	38病日	39病日	40病日	41病日	42病日	43病日	44病日	45病日	46病日	47病日	48病日	49病日	50病日	51病日	52病日	53病日	54病日	55病日	56病日
休薬完了	休薬完了																												休薬
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 204 ml/h 速度指示(時間)																					
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 レボホリナート注(l-LV) 250 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント l-LV 250mg/㎡@5FU+l-LV																					
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 600 mg/㎡ 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント【レボホリ開始1時間後側管から全開で】 5-FU 600mg/㎡																					
		【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【適下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 メトクロプラミド注射液10mg/2mL(ﾌﾟﾘﾝﾍﾟﾗﾝ) 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 200 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																					