**レジメン名** 5FU700＋CDDP70＋XRT q4w
**コメント** 食道癌
**標準適用日数** 28日

| 日付 | | 1病日 | 2病日 | 3病日 | 4病日 | 5病日 | 6病日 | 7病日 | 8病日 | 9病日 | 10病日 | 11病日 | 12病日 | 13病日 | 14病日 | 15病日 | 16病日 | 17病日 | 18病日 | 19病日 | 20病日 | 21病日 | 22病日 | 23病日 | 24病日 | 25病日 | 26病日 | 27病日 | 28病日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 休薬完了 | 休薬完了 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 休薬完了 |
| 注射 | 抗がん剤注射 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 212 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 408 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 408 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 生理食塩液 100mL 1 袋<br>デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 408 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間15分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h<br>速度指示（時間）注入時間30分<br>注射フリーコメント【CDDPの前】フィルタ付ルートを用いて投与する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 シスプラチン注(CDDP) 70 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 300 mL<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間2時間<br>注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製<br>【要遮光】<br>CDDP 70mg/㎡＠CDDP+5-FU＋XRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 700 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間24時間<br>注射フリーコメント 5-FU 700mg/㎡＠CDDP+5-FU＋XRT | 【滴下順:0】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 700 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間24時間<br>注射フリーコメント 5-FU 700mg/㎡＠CDDP+5-FU＋XRT | 【滴下順:0】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 700 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間24時間<br>注射フリーコメント 5-FU 700mg/㎡＠CDDP+5-FU＋XRT | 【滴下順:0】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 700 mg/㎡<br>生理食塩液 500mL 1 袋<br>用法 1日1回<br>速度指示（時間）注入時間24時間<br>注射フリーコメント 5-FU 700mg/㎡＠CDDP+5-FU＋XRT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:5】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:3】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:6】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | 【滴下順:2】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝF) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 250 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間2時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 【滴下順:7】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間3時間 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間3時間 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間3時間 | 【滴下順:4】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間3時間 | 【滴下順:1】<br>手技 持続点滴末梢メイン①<br>薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ｸﾞｨｰﾝD) 1 本<br>用法 1日1回<br>速度指示（速度）時間当たり 166.6 ml/h<br>注射フリーコメント 5FUの側管より投与<br>速度指示（時間）注入時間3時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 治療 | 抗がん剤処方 | 般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap<br>内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分<br>CDDP開始1～1.5時間前<br>CDDP＋5FU＋XRT療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap<br>内服1回 朝食後 2 日分<br>化学療法2日目と3日目に内服 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |