レジメン名 5FU800＋CDDP80 (NAC) q3w
コメント 食道癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 マンニットール注射液「YD」20%300mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【CDDPの前】フィルタ付ルートを用いて投与する																				
		【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V デキサート注射液1.65mg/0.5mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 2 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分																				
			【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分	【滴下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 100mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 408 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分															
		【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 シスプラチン注(CDDP) 80 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 300 mL 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント 生食200mLを抜いて調製 【要遮光】 CDDP 80mg/㎡@CDDP+5-FU																				
		【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント 5-FU 800mg/㎡@CDDP+5-FU	【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント 5-FU 800mg/㎡@CDDP+5-FU	【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント 5-FU 800mg/㎡@CDDP+5-FU	【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント 5-FU 800mg/㎡@CDDP+5-FU	【滴下順:0】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 フルオロウラシル(5-FU)注 800 mg/㎡ 生理食塩液 500mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間24時間 注射フリーコメント 5-FU 800mg/㎡@CDDP+5-FU													
		【滴下順:5】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与 速度指示(時間) 注入時間2時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与 速度指示(時間) 注入時間2時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与 速度指示(時間) 注入時間2時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与 速度指示(時間) 注入時間2時間	【滴下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与 速度指示(時間) 注入時間2時間													
		【滴下順:6】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンF輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾌ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 250 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与													
		【滴下順:7】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾑﾃﾞｨｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾑﾃﾞｨｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾑﾃﾞｨｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾑﾃﾞｨｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与	【滴下順:4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ソリューゲンG輸液500mL(ﾋﾞｰｴﾑﾃﾞｨｰ) 1 本 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 166.6 ml/h 注射フリーコメント 5FUの側管より投与													
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分 CDDP開始1～1.5時間前 CDDP＋5FU療法																				
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服 CDDP+5FU療法																			