レジメン名 GEM 1000+S1 60 (GS)(膵癌 GEST用)q3w
コメント 膵臓癌
標準適用日数 21日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日
休薬完了	休薬完了																					休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分							【適下順:1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 グラニセトロン点滴静注液バック1mg/50mL 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 208 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分													
		【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【GEST用】GEM 1000mg/㎡@GEM+S1(GS) S1体表面積と投与量 S1 60mg/㎡ 1.25㎡未満 60mg/b 20mg錠 朝2錠、夕1錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 80mg/b 1回20mg錠2錠 1日2回 1.5㎡以上 100mg/b 1回25mg錠2錠 1日2回							【適下順:2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 ゲムシタビン(GEM)点滴静注用(40mg/mL) 1000 mg/㎡ 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間30分 注射フリーコメント【GEST用】GEM 1000mg/㎡@GEM+S1(GS) S1体表面積と投与量 S1 60mg/㎡ 1.25㎡未満 60mg/b 20mg錠 朝2錠、夕1錠 1.25㎡以上1.5㎡未満 80mg/b 1回20mg錠2錠 1日2回 1.5㎡以上 100mg/b 1回25mg錠2錠 1日2回													
		【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与							【適下順:3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 600 ml/h 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント リンス 全開で投与													