レジメン名　IRIS+Bev5（CPT100+S1+Bev）q4w
コメント　大腸癌
標準適用日数　28日

日付		1病日	2病日	3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日	15病日	16病日	17病日	18病日	19病日	20病日	21病日	22病日	23病日	24病日	25病日	26病日	27病日	28病日
休薬完了	休薬完了																												休薬完了
注射	抗がん剤注射	【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾌｧﾙﾏ ﾃﾞｭﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分														【適下順：1】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アロキシ点滴静注用バッグ0．75mg 1 袋 デキサート注射液6.6mg/2mL(ﾌｧﾙﾏ ﾃﾞｭﾛﾝ) 1 V 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 208 ml/h 速度指示（時間）注入時間15分														
		【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント Bev 5mg/kg@IRIS+Bev 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可能														【適下順：2】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 アバスチン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント Bev 5mg/kg@IRIS+Bev 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可能														
		【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント CPT-11 100mg/㎡@IRIS+Bev														【適下順：3】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 イリノテカン(CPT-11)点滴静注(20mg/mL) 100 mg/㎡ ブドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示（時間）注入時間1時間30分 注射フリーコメント CPT-11 100mg/㎡@IRIS+Bev														
		【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分														【適下順：4】 手技 持続点滴末梢メイン① 薬品 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示（速度）時間当たり 600 ml/h 速度指示（時間）注入時間5分														
治療	抗がん剤処方	般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分																											
		ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始																											
		ティーエスワン配合OD錠T20 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 IRIS+Bev療法 S1 80mg/㎡ day1-14 2週間内服、2週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上、1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																											
		ティーエスワン配合OD錠T25 80mg/㎡ 内服2回 朝・夕食後 14 日分 IRIS+Bev療法 S1 80mg/㎡ day1-14 2週間内服、2週間休薬 S1 体表面積初回基準量 1.25㎡未満 40mg/回、20mg 4錠 1.25㎡以上、1.5㎡未満 50mg/回、25mg 4錠 1.5㎡以上 60mg/回、20mg 6錠																											
			般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法2日目と3日目に内服																											
			デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 3 日分 化学療法2日目から3日間内服																											
																般)アプレピタントカプセル125mg 1 cap 内服1回 化学療法1～1.5時間前 1 日分														
																ナウゼリンOD錠10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法15日目夕方から内服開始														
																	般)アプレピタントカプセル 80mg 1 cap 内服1回 朝食後 2 日分 化学療法16日目と17日目に内服														
																	デカドロン錠0．5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 3 日分 化学療法16日目から3日間内服														