

レジメン名 mFOLFOX6+Bev5 q2w
 コメント 大腸癌
 標準適用日数 14日

日付	1病日		2病日		3病日	4病日	5病日	6病日	7病日	8病日	9病日	10病日	11病日	12病日	13病日	14病日			
休業完了	休業完了															休業完了			
注射	抗がん剤注射	<p>【滴下薬:0】 手技 中心静脈(S①) 薬品 生理食塩液 20mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 800 ml/h 速度指示(時間) 注入時間2分 注射フリーコメント 開通確認用</p>																	
		<p>【滴下薬:1】 手技 中心静脈(S①) 薬品 アロキシン点滴静注用バッグO, 75mg 1 袋 デキセタン注射液6.6mg/2mL(7.5%・D) 1 V ホウロミン注5mg/mL 1 A 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 212 ml/h 速度指示(時間) 注入時間15分</p>																	
		<p>【滴下薬:2】 手技 中心静脈(S①) 薬品 アバスタン注(Bev) 5 mg/kg 生理食塩液 100mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間1時間30分 注射フリーコメント 初回90分、2回目60分、それ以降30分で投与可能 Bev 5mg/kg@mFOLFOX6+Bev</p>																	
		<p>【滴下薬:3】 手技 中心静脈(S①) 薬品 オキサリプラチン(L-OHP)点滴静注(5mg/mL) 85 mg/ml フドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント レボネリチールと同時に投与 L-OHP 85mg/ml@mFOLFOX6</p>																	
		<p>【滴下薬:3】 手技 中心静脈(留置留置管特設) 薬品 レボネリチール注(L-LV) 200 mg/ml フドウ糖注 5% 250mL 1 袋 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間2時間 注射フリーコメント オキサリプラチンと同時に投与。 L-LV200mg/ml</p>																	
治療	抗がん剤処方	<p>【滴下薬:4】 手技 中心静脈(S①) 薬品 フルオウラシル(5-FU)注 400 mg/ml 生理食塩液 50mL 1 瓶 用法 1日1回 速度指示(時間) 注入時間5分 注射フリーコメント オキサリプラチン終了後全開で投与。 5-FU 400mg/ml</p>																	
		<p>【滴下薬:5】 手技 中心静脈(S①) 薬品 フルオウラシル(5-FU)注 2400 mg/ml 生理食塩液 100mL 52 mL 用法 1日1回 速度指示(速度) 時間当たり 2173 ml/h 速度指示(時間) 注入時間46時間 注射コメント 輸液流量を100mLで自動計算 注射フリーコメント 5-FU 2400mg/ml@mFOLFOX6+Bev</p>																	
		<p>ナウゼリンOD錠 10mg 3 錠 内服3回 朝・昼・夕食前 7 日分 化学療法初日夕方から内服開始</p>																	
																	<p>予カドロン錠 0.5mg 8 錠 内服2回 朝・昼食後 2 日分 化学療法2日目、3日目に内服</p>		